

# Curso Revisiones Sistemáticas

Vitoria-Gasteiz, Marzo de  
2017



Centro español para los cuidados  
de salud basados en la evidencia  
[www.evidenciaencuidados.es](http://www.evidenciaencuidados.es)



**Osakidetza**



¿Existen diferencias entre la velocidad de infusión, complicaciones, dificultades y éxito en la inserción interósea humeral vs tibia proximal en pacientes críticos extrahospitalarios con compromiso vital?

- P** Adultos y pediátricos críticos hospitalarios con compromiso vital
- I** Inserción interósea humeral
- C** Inserción interósea tibia proximal
- O** Velocidad infusión, éxito inserción, complicaciones y dificultades
- S** ECA, EC no aleatorizados, estudios de casos y controles, estudios de cohortes

En pacientes adultos hospitalizados ¿es el llenado vesical con suero fisiológico previo a la retirada de sonda vesical más efectivo que otras técnicas en pacientes adultos hospitalizados para la recuperación de la micción espontánea?

- P** Pacientes adultos hospitalizados portadores de sonda vesical
- I** Llenado vesical con suero fisiológico previo a la retirada de sonda vesical
- C** Otras técnicas de retirada de sonda vesical
- O** Recuperación de primera micción espontánea
- S** ECA, EC no aleatorios, estudios pre-post y estudios observacionales.

# Efectividad de consultas no presenciales de enfermería a demanda en pacientes crónicos complejos

|          |  |
|----------|--|
| <b>P</b> | Pacientes crónicos complejos   |
| <b>I</b> | Consulta no presencial de enfermería a demanda   |
| <b>C</b> | Atención presencial tradicional  |
| <b>O</b> | Disminución de ingresos/reingresos, atenciones en servicios de urgencias, satisfacción del usuario, coste-efectividad          |
| <b>S</b> | ECA, EC no aleatorios, estudios observacionales: casos-control, cohortes, estudios de evaluación económica (coste-efectividad) |

# Evaluar las ventajas e inconvenientes del PICC vs reservorio en relación a seguridad, calidad de vida y satisfacción

|          |   |
|----------|---|
| <b>P</b> | Pacientes oncológicos adultos en tratamiento con quimioterapia              |
| <b>I</b> | PICC. Catéter central insertado periféricamente en vena basílica o cefálica |
| <b>C</b> | Reservorio venoso subcutáneo  |
| <b>O</b> | Calidad de vida, seguridad y satisfacción                                   |
| <b>S</b> | Estudios observacionales prospectivos, estudios cualitativos                |

En los profesionales sanitarios del sistema de emergencias extrahospitalaria que experimentan una intervención con resultado de muerte, ¿cuál es la eficacia de las estrategias para mejorar la resiliencia para disminuir la prevalencia del síndrome de burnout?

- P** Profesionales sanitarios del sistema de emergencias extrahospitalaria que experimentan una intervención con resultado de muerte
- I** Estrategias para mejorar la resiliencia
- C**
- O** Disminución la prevalencia del síndrome de burnout
- S** ECA, EC no aleatorizados, estudios pre-post, estudios observacionales