

Curso Revisiones sistemáticas

Sevilla 2015

Percepción de las mujeres en situación de violencia de género sobre las intervenciones institucionales

P

Mujeres mayores de 13 años que se encuentren o hayan sufrido una situación de violencia de género

I

Mujeres que hayan recibido intervenciones de apoyo ante la violencia de género

Co

Las intervenciones que se produzcan en el contexto de las instituciones. Se excluyen grupos de autoayuda y ONGs

S

Estudios cualitativos: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada

Estrategias de contención mecánica vs contención farmacológica en adultos con Trastorno Mental Grave para evitar agresiones

P

paciente agresivo >18 años de ambos sexos con TMG

I

Restricción física: equipos de contención mecánicas homologadas

C

Restricción farmacológica

O

Agresión/violencia auto o hetero dirigida declarada

S

ECAs, Estudios experimentales, Estudios observacionales analíticos

¿En pacientes pediátricos con traqueotomía en domicilio, la aspiración de secreciones de forma estéril disminuye el riesgo de infección con respecto a la no estéril?

P	Paciente pediátrico (0-14 años)portador de traqueotomía en domicilio
I	Aspiración técnica estéril
C	Aspiración técnica no estéril
O	Incidencia de Infección
S	ECAs, Estudios experimentales, Estudios observacionales analíticos y descriptivos

¿EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA EL SEGUIMIENTO TELÉFONICO REALIZADO POR ENFERMERAS REDUCE LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS?

P

Paciente sometido a CMA, dado de alta antes de las 24 horas del ingreso

I

Seguimiento telefónico mediante entrevista realizada por la enfermera

C

Práctica habitual

O

Número de complicaciones postoperatorias.

S

Estudios observacionales analíticos

¿SON EFICACES LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN PERSONAS ADULTAS CON SOBREPESO U OBESIDAD?

P

participantes ≥ 18 años con obesidad y/o sobrepeso (según la definición de la OMS)

I

Intervenciones de alimentación saludable en personas (que sigan las recomendaciones de la OMS)

C

No intervención/ otras

O

IMC o el peso, TA o Calidad de Vida

S

ECAs, cuasiexperimentales