

Curso Revisiones Sistemáticas

Cartagena, octubre, 2018



Centro español para los cuidados
de salud basados en la evidencia
www.evidenciaencuidados.es



Región de Murcia
Consejería de Salud



¿Cómo es la intervención que realiza la enfermera de atención primaria en la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género?

P Mujeres víctimas de violencia de género

I Intervenciones enfermeras en el ámbito de la Atención Primaria

C *

O Actividades realizadas por las enfermeras

S ECAs, Estudios cuasi experimentales, observacionales y descriptivos

*El objetivo de ésta revisión es recopilar intervenciones que realizan los profesionales de enfermería en el ámbito de la atención primaria, ya sean intervenciones definidas como propiamente enfermeras, o bien intervenciones llevadas a cabo por la enfermera de manera conjunta dentro de un equipo multidisciplinar. Lo cual desestima una comparación.

¿Cuál es la efectividad del uso terapéutico del óxido nitroso en el paciente atendido en servicios de urgencias?

- P** Paciente al que se le aplicará un procedimiento invasivo en el servicio de urgencias
- I** Uso del Óxido nitroso
- C** No precisa
- O** Uso terapéutico del óxido nitroso
- S** ECAs, Cuasi-experimentales

¿Es efectiva la valoración del dolor agudo mediante el empleo de la EN (NRS) en la valoración inicial de pacientes atendidos por SCA para proporcionar un mejor control del dolor en comparación con la práctica habitual?

- P** Personas adultas afectadas por episodio de SCA con dolor torácico
- I** Valoración inicial del dolor y su registro mediante EN
- C** Con la práctica habitual: cualquier forma de valoración inicial del dolor en la primera asistencia
- O** Control del dolor
- S** Ensayos controlados aleatorios y Estudios cuasiexperimentales. (En ausencia de estos métodos, se considerarán para su inclusión estudios de cohortes y de casos y control.)

EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES PARA LA DISMINUCION DEL CONSUMO DE BENZODIAZEPINAS EN PACIENTES INGRESADOS EN UNIDADES PSIQUIATRICAS

- P** PACIENTES INGRESADOS EN UNIDADES PSIQUIATRICAS CON UN RANGO DE EDAD DE 19-64 AÑOS
- I** INTERVENCIONES DIRIGIDAS A DISMINUIR EL CONSUMO DE BZD EN TRATAMIENTOS DE LARGA DURACION
- C** NO INTERVENCION
- O** DISMINUCION DE LA DOSIS DIARIA PRESCRITA, DEL CONSUMO DE BZD DE VIDA MEDIA CORTA Y POLIMEDICACION
- S** ECA Y ENSAYOS CLINICOS NO ALEATORIZADOS

¿Son efectivas las inyecciones intramusculares ventroglúteas en comparación con las dorsoglúteas para reducir los efectos adversos?

P Pacientes adultos

I Inyección intramuscular ventroglútea

C Inyección intramuscular dorsoglútea

O Reducir efectos adversos

S Ensayos clínicos controlados y aleatorizados, Ensayos clínicos no aleatorizados o cuasiexperimentales, Estudios observacionales (casos controles, cohortes)

¿Cuál es la efectividad de la comunicación de errores/efectos adversos por parte del paciente/cuidadores en la mejora de la seguridad durante la hospitalización?

- P** Usuarios/cuidadores en el ámbito hospitalario
- I** Participación del paciente y/o cuidadores en el proceso de comunicación de errores, efectos adversos o riesgos que afecten a la seguridad del paciente
- C** Práctica habitual, que implica la comunicación exclusivamente por parte de personal sanitario
- O** Mejora de la seguridad de los pacientes en cuanto a reducción de daños y riesgos innecesarios al paciente durante la atención hospitalaria
- S** Estudios experimentales que evalúen la efectividad de la participación de pte/cuidador en la comunicación de efectos adverso y/o errores que afecten a la seguridad del pte hospitalizado

¿Cuál es la Efectividad de la intervención no farmacológica en los cuidadores principales en riesgo de duelo patológico?

P CUIDADORES PRINCIPALES

I NO FARMACOLÓGICAS (NIC)

C No aplicable

O Disminución en la prevalencia de duelo complicado, tras la implementación de intervenciones no farmacológicas

S Ensayos controlados aleatorizados, estudios cuasi-experimentales no aleatorios, estudios observacionales (estudios de casos y controles y estudios de cohortes).